

Aidia genipiflora (DC.) Dandy

Identifiants : 1224/aidgen

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Rubiaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Rubiales ;
- Famille : Rubiaceae ;
- Genre : Aidia ;

- Synonymes : *Gardenia genipiflora* (DC.) Roberty, *Randia genipiflora* DC, *Solena genipiflora* (DC.) D. Dietr ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Karkar, ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruits secs^{{}(0(+x))}

Les fruits frais sont consommés. Ils sont également séchés et de l'eau ajoutée à nouveau plus tard

Partie testée : fruits séchés^{{}(0(+x))} (traduction automatique)

Original : Fruit dried^{{}(0(+x))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	226	0	5.9	0	0	23.7	3.0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Quartier du Kordofan. Il pousse en forêt fermée^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical plant. Kordofan district. It grows in closed forest^{{{0(+x)}}.}

- **Localisation :**

Afrique, Cameroun, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Africa, Cameroon, Equatorial Guinea, Guinea, Guinée, Guinea-Bissau, Sudan^{{{0(+x)}}.}

- **Notes :**

Composition chimique: Protéine (brute) = 5,9% (sèche). Matières grasses = 1,2% (sec). Fibres (brutes) = 12,3% (sèches). Cendres = 4,9% (sec). Glucides (solubles): Amidon = 10,1% (sec). Saccharose = 14,8% (sec). D-glucose = 5,3% (sec). F-fructose = 6,9% (sec). Acides aminés (g [16 g N] -1): acide aspartique = 11 g. Thréonine = 2,5 g. Sérine = 2,9 g. Acide glutamique = 7,3 g. Proline = 2,4 g. Glycine = 3,6 g. Alanine = 2,9 g. Valine = 3,4 g. Cystéine = 0,7 g. Méthionine = 0,7 g. Isoleucine = 2,5 g. Leucine = 4,4 g. Tyrosine = 2,2 g. Phénylalanine = 2,7 g. Lysine = 3,1 g. Histidine = 1,7 g. Arginine = 6,6 g. Minéraux - Soufre = 0,06% (sec). Potassium = 0,14% (sec). Magnésium = 0,12% (sec). Calcium = 0,19% (sec). Na = 0,01% (sec). K = 1,64% (sec). Zinc = 5 mg / kg (sec). Fer = 302 mg / kg (sec). Manganèse = 24 mg / kg (sec)) Cuivre = 4 mg / kg (sec)^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Chemical composition: Protein (crude) = 5.9% (dry). Fat = 1.2% (dry). Fibre (crude) = 12.3% (dry). Ash = 4.9% (dry). Carbohydrate (soluble): Starch = 10.1% (dry). Sucrose = 14.8% (dry). D-Glucose = 5.3% (dry). F-Fructose = 6.9% (dry). Amino acids (g [16g N]-1): Aspartic Acid = 11g. Threonine = 2.5g. Serine = 2.9g. Glutamic Acid = 7.3g. Proline = 2.4g. Glycine = 3.6g. Alanine = 2.9g. Valine = 3.4g. Cysteine = 0.7g. Methionine = 0.7g. Isoleucine = 2.5g. Leucine = 4.4g. Tyrosine = 2.2g. Phenylalanine = 2.7g. Lysine = 3.1g. Histidine = 1.7g. Arginine = 6.6g. Minerals - Sulphur = 0.06% (dry). Potassium = 0.14% (dry). Magnesium = 0.12% (dry). Calcium = 0.19% (dry). Na = 0.01% (dry). K = 1.64% (dry). Zinc = 5mg/kg (dry). Iron = 302mg/kg (dry). Manganese = 24mg/kg (dry). Copper = 4mg/kg (dry)^{{{0(+x)}}.}

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

ABDELMUTI (As *Randia genipiflora*) ; Burkill, H. M., 1997, *The Useful Plants of West Tropical Africa*. Vol. 4 969 pp ; Guil-Guerrero, J. L., et al, 2001, *Edible Wild Plants. in Recent Progress in Medicinal Plants* Vol. 8 Sci. Tech publishing, Texas (As *Randia genipiflora*) ; Prodr. 4:389. 1830 (As *Randia genipiflora*)