

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.

Identifiants : 16581/hyphcapn

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 27/04/2024

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Fungi ;
- Division : Basidiomycota ;
- Classe : Agaricomycetes ;
- Ordre : Agaricales ;
- Famille : Strophariaceae ;
- Genre : Hypholoma ;

- Synonymes : Naematoloma capnoides ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Grey-gilled tuft Agaric, , Conifer tuft, Nalleuauu, Smoky-gilled hypholoma ;

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : champignon^{{{0(+x)}} (traduction automatique)} | Original : Mushroom, Fungus^{{{0(+x)}}} Les organes de fructification sont mangés. Ils sont mieux utilisés jeunes. Ils peuvent être sautés



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Christensen, M., et al, 2008, Collection and Use of Wild Edible Fungi in Nepal. Economic Botany, 62(1), 2008, pp. 12-23 ; Devkota, S., 2008, Distribution and Status of Highland mushrooms: A study from Dolpa, Nepal. J.Nat.Hist.Mus.Vol.23,2008, 51-59 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 254 ; Kaufmann, B. et al, 1999, The Great Encyclopedia of Mushrooms. Konemann. p 142 ; Pace, G., 1998, Mushrooms of the world. Firefly books. p 56 ; Vetner, J., 2004, Arsenic content of some edible mushroom species. Eur. Food Res. Technol. 219: 71-74 ; Vetner, J., 2005, Lithium content of some common edible wild-growing mushrooms. Food Chemistry 90:31-37

