

Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst.

Identifiants : 24327/pilret

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 13/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;
- Genre : Piliostigma ;

- Synonymes : Bauhinia reticulata DC ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Camel's foot leaf tree, , Banguin-gu, Barque, Canna, Epamambo, Fara, Kalgo, Kossey, N'toncre, Nama tene, Pouunque, Untoncre ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : graines, feuilles, gousses, fruits, légumes^{{{0(+x)}}} (traduction automatique) | Original : Seeds, Leaves, Pods, Fruit, Vegetable^{{{0(+x)}}} Les feuilles sont utilisées pour les boissons. Ils sont également utilisés pour aromatiser la bouillie. Ils sont acides. Les fruits sont utilisés pour les boissons. Les jeunes gousses sont pilées et bouillies. L'écorce et la sève sont utilisées pour purifier l'eau. Ils aident à coaguler la matière trouble dans l'eau

Partie testée : feuilles^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Leaves^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
78.3	276	66	4.8	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Abbiw, D.K., 1990, *Useful Plants of Ghana. West African uses of wild and cultivated plants. Intermediate Technology Publications and the Royal Botanic Gardens, Kew.* p 48 ; Ayantunde, A. A., et al, 2009, *Uses of Local Plant Species by Agropastoralists in South-western Niger. Ethnobotany Research and Applications. Vol. 7:* 53-66 ; Belem, B., et al, 2007, *Use of Non Wood Forest Products by local people bordering the "Parc National Kaboré" Tambi, Burkina Faso. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies* vol. 6, no. 1 p 9 ; Bernholt, H. et al, 2009, *Plant species richness and diversity in urban and peri-urban gardens of Niamey, Niger. Agroforestry Systems* 77:159-179 ; Burkill, H. M., 1985, *The useful plants of west tropical Africa, Vol. 3.* Kew. ; Dalziel, J. M., 1937, *The Useful plants of west tropical Africa.* Crown Agents for the Colonies London. ; Dansi, A., et al, 2008, *Traditional leafy vegetables and their use in the Benin Republic. Genet Resour Crop Evol* (2008) 55:1239-1256 ; Flora 29:598. 1846 ; Food Composition Tables for use in Africa FAO <http://www.fao.org/infoods/directory> No. 523 ; Gallagher, D. E., 2010, *Farming beyond the escarpment: Society, Environment, and Mobility in Precolonial Southeastern Burkina Faso.* PhD University of Michigan. ; Jardin, C., 1970, *List of Foods Used In Africa,* FAO Nutrition Information Document Series No 2.p 28, 95, 155 ; Martin, F.W. & Ruberte, R.M., 1979, *Edible Leaves of the Tropics.* Antillian College Press, Mayaguez, Puerto Rico. p 198 (As *Bauhinia reticulata*) ; Prodr. 2:515. 1825 (As *Bauhinia reticulata*) ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, *Edible Wild plants of Sub-saharan Africa.* Kew. p 123 ; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). *Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database.* Published on the Internet; <http://www.rbgekew.org.uk/ceb/sepasal/internet> [Accessed 21st April 2011] ; Terra, G.J.A., 1973, *Tropical Vegetables.* Communication 54e Royal Tropical Institute, Amsterdam, p 29 (As *Bauhinia reticulata*)