

Sideroxylon obtusifolium (Roemer & Schultes) Pennington subsp. buxifolium

Identifiants : 30049/sidobta

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 23/05/2024

- **Classification phylogénétique :**
 - Clade : Angiospermes ;
 - Clade : Dicotylédones vraies ;
 - Clade : Astéridées ;
 - Ordre : Ericales ;
 - Famille : Sapotaceae ;
- **Classification/taxinomie traditionnelle :**
 - Règne : Plantae ;
 - Division : Magnoliophyta ;
 - Classe : Magnoliopsida ;
 - Ordre : Ebenales ;
 - Famille : Sapotaceae ;
 - Genre : Sideroxylon ;
- **Synonymes :** *Bumelia obtusifolia* Roemer & Schultes, *Sideroxylon pacurero* Loefling, *Bumelia sartorum* Martius, *Bumelia rhamnoides* Casaretto, *Bumelia excelsa* A DC, *Bumelia obtusifolia* var. *excelsa* A DC, *Bumelia rotundifolia* Swartz sensu Kunth, *Bumelia buxifolia* Roem. & Schult, *Bumelia dunantii* DC, *Bumelia cruegerii* Griseb, *Bumelia nicaraguensis* Loes, *Bumelia conglobata* Standl, *Bumelia mayana* Standl, *Bumelia sartorum* var. *latifolia* Miquel, *Bumelia sartorum* F.Allemao, *Bumelia fragrans* Ridley, *Lycoides buxifolia* (Roem.) & Schult.) Kuntze, *Lycoides dunantii* (DC.) Kuntze, *Lycoides obtusifolium* (Roemer & Schultes)Kuntze, *Lycoides sartorum* (Martius) Kuntze, *Bumelia obtusifoliua* subsp. *excelsa* (A DC in A DC) Cronquist, *Apterygia sartorum* subsp. *typica* Cronquist ;
- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Avalo, Cagalera, Caimito, , Cacho de venado, Caimito, Chirimolle, Coca, Coronilha, Coronilha-da-praia, Guajaivirai, Guaranina, Guayavi, Ibiranhira, Lanza colorada, Laranjunha-preta, Macaranduba-da-praia, Miri, Niwariro, Olorco molle, Picurero, Quixaba, Quixabeira, Rompe-gibao, Sacutiaba, Sapotiaba ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Données absentes/manquantes et/ou insuffisantes^{{{(rp*)}}}

Les fruits sucrés sont consommés crus. Ils sont également utilisés pour faire une boisson alcoolisée

Partie testée : fruit^{{{(0(+x))}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{(0(+x))}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
65.6	616	147	1.6	0	16.4	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- ***Liens, sources et/ou références :***

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;