

***Solanum cajanumense* Kunth, 1818**

(Casana)

Identifiants : 30350/solcaj

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 30/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- **Clade : Angiospermes ;**
- **Clade : Dicotylédones vraies ;**
- **Clade : Astéridées ;**
- **Clade : Lamiidées ;**
- **Ordre : Solanales ;**
- **Famille : Solanaceae ;**

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne : Plantae ;**
- **Division : Magnoliophyta ;**
- **Classe : Magnoliopsida ;**
- **Ordre : Solanales ;**
- **Famille : Solanaceae ;**
- **Genre : Solanum ;**
- **Section : Pachyphylla ;**

- **Synonymes : *Cyphomandra cajanumensis* (Kunth) Sendtn. ex Walp. 1847 (nom irrésolu, selon TPL), *Cyphomandra casana* A.Child 1986 (nom irrésolu, selon TPL) ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : casana, pepino de campo, pepinillo , *Cajanuma nightshade*, *Mihinkas*, *Pepino de campo*, *Sache tomate*, *Tomate de monte*, *Tomate silvestre* ;**



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit (fruits^{0(+x)} mûrs (dont graines)^{(((dp*))} comestible^{0(+x)}.(1*) Les fruits mûrs sont comestibles. Attention: D'autres parties de la plante sont toxiques



(1*)ATTENTION : comme bon nombre d'autres espèces du même genre, le fruit immature (vert) ainsi que toutes les autres parties de la plante pourraient être toxiques.(1*)ATTENTION : comme bon nombre d'autres espèces du même genre, le fruit immature (vert) ainsi que toutes les autres parties de la plante pourraient être toxiques^{(((dp*))}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Rodolfo Vásquez, via [tropical.theferns](https://tropical.theferns.com)

Par Rodolfo Vásquez, via [tropical.theferns](https://tropical.theferns.com)

- **Autres infos :** Actuellement *Cyphomandra* est traité comme un sous-genre de *Solanum*^{(((dp*))}.

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

◦ **Statut :**

Il est à l'étude en tant que culture commerciale possible en Nouvelle-Zélande^{(((0(+x)) (traduction automatique)}.

Original : It is being explored as a possible commercial crop in New Zealand^{(((0(+x))}.

◦ **Distribution :**

C'est une plante tropicale. Il a besoin de conditions fraîches et ombragées mais ne peut tolérer le gel. Il pousse dans la forêt nuageuse. Il pousse entre 1 500 et 3 000 m d'altitude^{(((0(+x)) (traduction automatique)}.

Original : It is a tropical plant. It needs cool shady conditions but cannot tolerate frost. It grows in cloud forest. It grows between 1,500-3,000 m above sea level^{(((0(+x))}.

◦ **Localisation :**

Amazonie, Andes, Colombie, Equateur, Nouvelle-Zélande, Pérou, Amérique du Sud^{(((0(+x)) (traduction automatique)}.

Original : Amazon, Andes, Colombia, Ecuador, New Zealand, Peru, South America^{(((0(+x))}.

- **Liens, sources et/ou références :**

◦ **"THE NATURAL FOOD HUB" (en anglais) :**

https://www.naturalhub.com/grow_fruit_type_tamarillo_relative_new_zealand.htm ;

dont classification :

◦ **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-29605716 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" ([*Cyphomandra cajanumensis* (Kunth) Sendtn. ex Walp.], en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

References Bohs, L., 1994, Cyphomandra (Solanaceae): Flora Neotropica, Vol. 63, pp. 59 ; Hernandez Bermejo, J.E., and Leon, J. (Eds.), 1994, Neglected Crops. 1492 from a different perspective. FAO Plant Production and Protection Series No 26. FAO, Rome. p 186 ; Van den Eynden, V., et al, 2003, Wild Foods from South Ecuador. Economic Botany 57(4): 576-603 ; Van den Eynden, V., 2004, Use and management of edible non-crop plants in southern Ecuador, Ph D dissertation. p 108