Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchs.

Identifiants : 37713/stapla

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 11/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Monocotylédones ;***
    - ***Clade : Commelinidées ;***
    - ***Ordre : Zingiberales ;***
    - ***Famille : Marantaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Liliopsida ;***
    - ***Ordre : Zingiberales ;***
    - ***Famille : Marantaceae ;***
    - ***Genre : Stachyphrynium ;***
- ***Synonymes : Maranta parviflora (Roxb.) A. Dietr, Maranta placentaria (Lour.) A. Dietr, Phrynium densiflorum Blume, Phrynium densiflorum Moritzi [Illegitimate], Phrynium glabrum Ridl, Phrynium parviflorum Roxb, Phrynium placentarium (Lour.) Merr, Phrynium sinicum Miquel, Phrynium tetranthum K. Schum, Phyllodes densiflora (Blume) Kuntze, Phyllodes placentaria Loureiro ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Wild maranta, , Gangru, Jian bao zhong ye, Maranta hutan, Traw prei ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

Parties comestibles : feuilles - saveur, boutons floraux, rhizome{{{0(+x) (traduction automatique)} | Original : Leaves - flavour, Flower buds, Rhizome{{{0(+x)} Les feuilles sont utilisées pour envelopper les aliments pour leur donner de la saveur. (Les feuilles ne sont pas mangées) ._ x000B_Les boutons floraux sont utilisés pour faire du vinaigre. Le rhizome est bouilli et mangé

néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Liens, sources et/ou références :***

dont classification :

dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Clausager, K. & Bochsenius, F., 2003, The Marantaceae of Sabah, Northern Borneo. Kew Bulletin, Vol. 58, No. 3 (2003), pp. 647-678 ; Konsam, S., et al, 2016, Assessment of wild leafy vegetables traditionally consumed by the ethnic communities of Manipur, northeast India. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 12:9 (As Phrynium placentarium) ; Phon, P., 2000, Plants used in Cambodia. Â© Pauline Dy Phon, Phnom Penh, Cambodia. p 496 (As Phrynium placentarium) ; Sukarya, D. G., (Ed.) 2013, 3,500 Plant Species of the Botanic Gardens of Indonesia. LIPI