

Sterculia oblonga Mast.

Identifiants : 37877/steobo

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 12/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;
- Genre : Sterculia ;

- **Synonymes : Clompanus oblonga (Mast.) Kuntze, Eribroma oblonga (Mast.) Pierre ex A Chev, Sterculia elegantiflora Hutch. & Dalziel, ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Yellow Sterculia, , Bi, Bongele, Bongo, Eboyo, Eyong, G'boyo, Kokoniko, Kuil, Lom, Mgwan, Nzong, Ohaa, Okoko, Oroforofo ;**



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Parties comestibles : graines, condiments, épices^{{}{{0(+x)}} (traduction automatique)} | Original : Seeds, Condiment, Spice^{{}{{0(+x)}} Les graines sont grillées et mangées. Ils peuvent être rôtis, moulus et cuits avec d'autres aliments}



néant, inconnus ou indéterminés.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Burkill, H. M., 1985, The useful plants of west tropical Africa, Vol. 5. Kew. (As Eribroma oblonga) ; Chapman, J. D. & Chapman, H. M., 2001, The Forest Flora of Taraba and Andamawa States, Nigeria. WWF & University of Canterbury. p 206 ; Dalziel, 1937, ; Fern, K., 2012, Tropical Species Database <http://theferns.info/tropical/> ; Germain, R., 1963, Flore du Congo du Rwanda et du Burundi: Sterculiaceae. vol. 10, (As Eribroma oblonga) ; Jardin, C., 1970, List of Foods Used In Africa, FAO Nutrition Information Document Series No 2.p 36 ; Les Vegetaux utiles de l'Afrique tropicale français 9:78. 1917 (Bois du Gabon) (As Eribroma oblonga) ; D. Oliver, Fl. trop. Afr.

1:216. 1868 ; Oteng-Amoako, A. A. (Ed.), 2006, 100 Tropical African Timber Trees from Ghana. Forestry Research Institute of Ghana. p 228 ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-saharan Africa. Kew. p 189 ; Sonke, B. and Couvreur T., 2014, Tree diversity of the Dja Faunal Reserve, southeastern Cameroon. Biodiversity Data Journal 2:e1049 (As *Eribroma oblonga*) ; The Digital Flora of Central Africa, 2013, (Democratic Republic of Congo, Rwanda & Burundi) Botanical Garden Meise (As *Eribroma oblonga*) ; Vivien, J. & Faure, J.J., 1985, Abres des forets dense d'Afrique Centrale. Agence de Cooperation Culturelle et Technique. Paris. p 454 (As *Eribroma oblonga*) ; Vivien, J., & Faure, J.J., 1996, Fruitiers Sauvages d'Afrique. Espèces du Cameroun. CTA p 347 (As *Eribroma oblonga*)