

Syzygium guineense (Willd.) DC. subsp. barotsense

Identifiants : 38356/syzguib

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 12/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;
- Genre : Syzygium ;

- Synonymes : Calyptranthes guineensis Willd, Eugenia fleuryi A. Chev, Eugenia guineensis (Willd.) Baill. ex Laness, Memecylon lopezianum A. Chev, Syzygium guineense (Willd.) DC. var. littorale Keay ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Water berry, Woodland waterberry, Water pear , Adere, Badesa, Bedessa, Daguwa, Dinntho, Diwa, Dokima, Dokma, Duuwancho, Isenren, Kada, Kano, Kayinata, Lungama, Mchovozi, Metucuria, Mhlangu, Mho, Mivengi lutanana, Mkowosi, Mlama, Mmako, Mmasai, Mshihwi, Msiu, Msu, Mubowa, Mucotamu, Mufinsa, Muhuu, Mukute, Mukuti dombo, Mumawa, Mundurunduru, Munhene, Musafwa, Musombo, Musom-bosombo, Musu, Muthwa, Mutoya, Muvengi, Mzambarau pori, Nkisu, Nkizu, Ocha, Ochi, Okak, Sansan boto, Shiringi, Tukuma, Unhlulwozi, Water umdoni, Xikwathi ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Données absentes/manquantes et/ou insuffisantes^{(((rp*))}

Le fruit mûr se mange cru. Ils sont également utilisés pour les boissons. Ils sont utilisés dans les relish et les chutneys. L'écorce est utilisée pour le thé. Les racines sont mangées



néant, inconnus ou indéterminés.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

