

Tapinanthus oleifolius (J. C. Wendl.) Danser

Identifiants : 38610/tapole

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 16/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Ordre : Santalales ;
- Famille : Loranthaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Santalales ;
- Famille : Loranthaceae ;
- Genre : Tapinanthus ;

- Synonymes : *Loranthus meyeri* C. Presl, *Loranthus meyeri* C. Presl var. *inachabensis* Engl, *Loranthus speciosus* F. Dietr., *Lichtensteinia oleifolia* J. C. Wendl, *Loranthus namaquensis* Harv, *Loranthus oleifolius* (J. C. Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *luteus* Neusser, *Loranthus oleifolius* (J. C. Wendl.) Cham. & Schltdl, *Tapinanthus namaquensis* (Harv.) Tiegh ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Bird-lime, Lighted candles, , Haires, Haitsuib, Maias, Oilunda, Pagamela ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : tiges - boisson, fleurs, fruits^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique) | Original : Stems - drink, Flowers, Fruit^{{{{0(+x)}}}} Les tiges sont séchées, pilées et cuites. Ensuite, du sucre et du lait sont ajoutés pour faire une boisson. Le nectar est aspiré des fleurs. Les fruits sont consommés crus, frais ou séchés



néant, inconnus ou indéterminés.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet; <http://www.rbgekew.org.uk/ceb/sepasal/internet> [Accessed 3rd May 2011]