Triteleia hyacinthina (Lindl.) Greene
(Triteleia hyacinthina)

Identifiants : 39654/trihya

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 11/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Monocotylédones ;***
    - ***Ordre : Asparagales ;***
    - ***Famille : Asparagaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Liliopsida ;***
    - ***Ordre : Liliales ;***
    - ***Famille : Liliaceae ;***
    - ***Genre : Triteleia ;***
- ***Synonymes : Allium tilingii Regel, Brodiaea dissimulata M. Peck, Brodiaea hyacinthina (Lindl.) Baker, Brodiaea lactea (Lindl.) S. Watson, Hesperoscordum hyacinthium Lindl, Hesperoscordum lacteum Lindl, Hesperoscordum lewisii Hook, Hookera hyacinthina (Lindl.) Hook, Milla hyacinthina (Lindl.) Baker, Scaduakintos umbellaris Raf, Triteleia lactea (Lindl.) Davidson & Moxley, Veatchia crystallina Kellogg ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : hyacinth brodiaea, white brodiaea, white tripletlily, fool's onion , Bulbe - cru ou cuit. Riche en amidon, les bulbes peuvent être utilisés comme la pomme de terre, par exemple bouillis et écrasés en purée. ;***
- ***Rusticité (résistance face au froid/gel) : -20°C ;***

- ***Note comestibilité : ******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Bulbe – cru ou cuit. Riche en amidon, les bulbes peuvent être utilisés comme la pomme de terre, par exemple bouillis et écrasés en purée.bulbe - cru ou cuit.

  Détails :

  Riche en amidon, le bulbe peut être utilisé comme la pomme de terre. Aliment d'urgence, il n'est utilisé que lorsque tout le reste a échoué$^{\{\{\{5(+)}$. Les bulbes sont bouillis et écrasés$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Les bulbes sont bouillis et écrasés

  néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***



De gauche à droite :

Par Lindley, J., Edwards's Botanical Register (1829-1847) Edwards's Bot. Reg. vol. 19 (1833) [tt. 1565-1652] t. 1639, via plantillustrations
Par Hooker, W.J., Flora boreali-americana, or, the botany of the northern parts of British America (1829-1840) Fl. Bor.-Amer. (Hooker) vol. 2 (1840) t. 198, via plantillustrations
Par Stan Shebs, via x
Par Stan Shebs, via x

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tempérée. Ils ont besoin de sols humides et bien drainés. Les sols ne doivent jamais être saturés d'eau. Il convient aux zones de rusticité 4-9[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : It is a temperate plant. They need moist, well-drained soils. The soils should never be waterlogged. It suits hardiness zones 4-9[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Australie, Canada *, Amérique du Nord *, Tasmanie, USA[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Australia, Canada*, North America*, Tasmania, USA[{{{0(+x)].

  - ***Notes :***

    Il existe 15 espèces de Tritelia. Aussi mis dans la famille Alliaceae[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : There are 15 Tritelia species. Also put in the family Alliaceae[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** 5https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Triteleia+hyacinthina ***;***

    dont classification :

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Beckstrom-Sternberg, Stephen M., and James A. Duke. "The Foodplant Database."http://probe.nalusda.gov:8300/cgi-bin/browse/foodplantdb.(ACEDB version 4.0 - data version July 1994) (As Hesperoscordum hyacinthinum) ; Bull. Calif. Acad. Sci. ser. 2, 6:139. 1886 ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 1432 ; Edward's Bot. Reg. 15: sub t. 1293. 1830 (As Hesperoscordum hyacinthinum) ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 302 ; Moerman, D. F., 2010, Native American Ethnobotany. Timber Press. p 569