

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.

Identifiants : 39992/urebac

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Urticaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Urticales ;
- Famille : Urticaceae ;
- Genre : Urera ;

- Synonymes : *Urera armigera* (C.Presl) Miq, *Urera baccifera* var. *horrida* (Kunth) Wedd, *Urera denticulata* Miq, *Urera horrida* (Kunth) Miq, *Urera nitida* (Vell.) P.Brack, *Urtica armigera* C.Presl, *Urtica baccifera* L., *Urtica grandidentata* Liebm, *Urtica horrida* Kunth, *Urtica nitida* Vell ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Bugrun, , Cansancao-roxa, Chichicaste, Guaritoto, Ishanga, Mala mujer, Manman guepes, Nigua, Ortiga, Pringamoza, Scratchbush, Sinalwo, Urtiga-branca, Urtiga-da-folha-grande, Urtigao, Urtigao-bravo, Urtiga-vermelha ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : pousses, feuilles, fruits^{{{0(+x)}}} (traduction automatique) | Original : Shoots, Leaves, Fruit^{{{0(+x)}}} Mise en garde. Les feuilles peuvent provoquer des picotements très graves



néant, inconnus ou indéterminés.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Alimenticias - FloraSBS ; Castaneda, H., & Stepp, J. R., 2007, Ecosystems as Sources of Useful Plants for the Guaymi People of Costa Rica. *Ethnobotany Journal*. 5:249-257 ; Garcia-Serrano, C. R., & Del Monte, J. P., 2004, The Use of Tropical Forest (Agroecosystems and wild Plant harvesting) as a Source of Food in the Bribri and Cabecar Cultures in the Caribbean Coast of Costa Rica. *Economic Botany* 58(1) pp 58-71 ; Grandtner, M. M. & Chevrette, J.,

2013, *Dictionary of Trees, Volume 2: South America: Nomenclature, Taxonomy and Ecology*. Academic Press p 681 ; INFOODSUpdatedFGU-list.xls ; Kinupp, V. F., 2007, *Plantas alimenticias nao-convencionais da regio metropolitana de Porto Alegre, RS, Brazil* p 105 ; Kinupp, V. F. & Bergman, I., 2008, *Protein and minerals of native species, potential vegetables and fruits*. *Cienc.Tecnol. Aliment.* Vol. 28 No. 4 Campinas Oct/Dec. ; Langlois, H. C., 2004, *Ethnobotanical analysis of different successional stages as sources of wild edible plants for the Guaymi people in Costa Rica*. M. Sc. thesis University of Florida. ; *Plants of Haiti* Smithsonian Institute [http://botany.si.edu/antilles/West Indies](http://botany.si.edu/antilles/West%20Indies) ; Scarpa, G. F., 2009, *Wild food plants used by the indigenous peoples of South American Gran Chaco: A general synopsis and intercultural comparison*. *Journal of Applied Botany and Food Quality* 83:90-101