

Vigna vexillata (L.) A. Rich., 1845 var. ovata

Identifiants : 40665/vigvexd

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;
- Genre : Vigna ;

- Synonymes : *Dolichos cylindricus* Desv, *Dolichos vexillatus* (L.) Kunth, *Phaseolus capensis* sensu Thunb, *Phaseolus glycinaeformis* J. A. Weinm, *Phaseolus humifusus* Savi, *Phaseolus pulniensis* Wight, *Phaseolus quadriflorus* A. Rich, *Phaseolus sepiarius* Dalz, *Phaseolus vexillatus* L. *Plectrotropis angustifolia* Schum. & Thonn, *Plectrotropis hirsuta* Schum. & Thonn, *Strophostyles capensis* E. Meyer, *Vigna angustifolia* (Schum. & Thonn.) Hook.f, *Vigna capensis* (Thunb.) Burt Davy, *Vigna carinalis* Benth, *Vigna crinita* A. Rich, *Vigna davyi* Bolus, *Vigna dinteri* Harms, *Vigna dolichoneura* Harms, *Vigna golungensis* Baker, *Vigna hirta* Hook, *Vigna lobatifolia* Baker, *Vigna phaseoloides* Baker, *Vigna scabra* Sonder, *Vigna senegalensis* A. Chev, *Vigna thonningii* Hook. f, *Vigna tuberosa* A. Rich, *Vigna vexillata* (L.) A. Rich. var. *hirta* (Hook.) Baker .f, *Vigna vexillata* (L.) A. Rich. var. *thonningii* (Hook.) Baker ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Wild cowpea, Pencil yam , Bejuco marrullero, Bir ghangra, Bonoria urahi, Cam-demba-uri, Chandor, Chaoli, Dau co, Hadunda, Halgia, Halunda, Kaadu taguni, Mgcenga, Murudji, Musivha, Nkasa zimadeso, Nyemba, Obhombo, Qwruh-dibela, Wild mung ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Les racines sont cuites au Soudan et en Éthiopie^{[[77]]}.

Les racines tubéreuses sont consommées crues ou cuites. Ils peuvent être bouillis ou rôtis. Les graines sont cuites et mangées. Les feuilles peuvent être consommées comme légume et séchées

Partie testée : racine^{[[0(+x)]] (traduction automatique)}

Original : Root^{[[0(+x)]]}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
68.9	287	69	2.3	0	0	10.0	1.7



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=435339> ;