Viola cucullata

Identifiants : 40697/viocuc

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 10/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Fabidées ;***
    - ***Ordre : Malpighiales ;***
    - ***Famille : Violaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Violales ;***
    - ***Famille : Violaceae ;***
    - ***Genre : Viola ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Marsh Blue Violet ;***

- ***Note comestibilité : ******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Jeunes feuilles et boutons floraux – crus ou cuits. Lorsqu'ils sont ajoutés à la soupe, ils l'épaississent de la même manière que le gombo.

  Un thé peut être préparé à partir des feuilles[{{{5(+)].

  néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Note médicinale : ****
- ***Usages médicinaux : Une infusion de la plante a été utilisée dans le traitement de la toux, du rhume et de la dysenterie. Un cataplasme de feuilles a été utilisé pour réduire la douleur des maux de tête. Un cataplasme de racine écrasée a été appliqué sur les furoncles[{{{5(+) ;***
- ***Usages médicinaux : C'est une bonne plante couvre-sol, mais elle met du temps à s'épaissir et peut nécessiter un désherbage pendant environ la première année[197]. Une infusion de racine a été utilisée pour tremper les graines de maïs avant de les planter afin d'éloigner les insectes[257]. Associations fauniques : Le nectar floral de la violette des marais attire les bourdons, les abeilles maçonnes (Osmia spp.), les abeilles halictides, les abeilles andrénides, les mouches abeilles (Bombyliidae), les papillons et les hespéries (Robertson, 1929). Certaines abeilles récoltent également du pollen. Une abeille oligolectique, Andrena violae, visite les fleurs de Marsh Violet et d'autres Viola spp. (violettes). Les chenilles de plusieurs papillons fritillaires se nourrissent du feuillage des violettes principalement dans les zones ouvertes : Boloria bellona (Fritillaire des prairies), Boloria selene myrina (Fritillaire à bordure argentée), Euptoieta claudia (Fritillaire panachée),***

Speyeria aphrodite (Aphrodite Fritillaire), Speyeria atlantis. (Atlantis Fritillary), Speyeria cybele (Great Spangled Fritillary) et Speyeria idalia (Regal Fritillary). D'autres insectes se nourrissent d'insectes, notamment les chenilles des papillons Elaphria grata (Grateful Midget) et Eubaphe mendica (Le Mendiant), les larves mineuses de feuilles d'Ametastegia pallipes (Violet Sawfly), le puceron Neotoxoptera violae et les thrips Odontothrips pictipennis. Les graines et autres parties des violettes sont occasionnellement mangées par des oiseaux tels que la gélinotte huppée, le dindon sauvage et la tourterelle triste, ainsi que par la souris à pattes blanches, la souris des pins et le tamia de l'Est. De même, le feuillage de ces plantes basses constitue une source de nourriture pour le lapin à queue blanche et la tortue des bois (Clemmys insculpta) [1-6]. ;
A good ground cover plant but it is slow to thicken up and may need weeding for the first year or so[197]. An infusion of the root has been used to soak corn seeds before planting them in order to keep off insects[257]. Faunal Associations: The floral nectar of Marsh Violet attracts bumblebees, mason bees (Osmia spp.), Halictid bees, Andrenid bees, bee flies (Bombyliidae), butterflies, and skippers (Robertson, 1929). Some of the bees also collect pollen. An oligolectic bee, Andrena violae, visits the flowers of Marsh Violet and other Viola spp. (violets). The caterpillars of several Fritillary butterflies feed on the foliage of violets primarily in open areas: Boloria bellona (Meadow Fritillary), Boloria selene myrina (Silver-Bordered Fritillary), Euptoieta claudia (Variegated Fritillary), Speyeria aphrodite (Aphrodite Fritillary), Speyeria atlantis (Atlantis Fritillary), Speyeria cybele (Great Spangled Fritillary), and Speyeria idalia (Regal Fritillary). Other insect feeders include caterpillars of the moths Elaphria grata (Grateful Midget) and Eubaphe mendica (The Beggar), the leaf-mining larvae of Ametastegia pallipes (Violet Sawfly), the aphid Neotoxoptera violae, and the thrips Odontothrips pictipennis. The seeds and other parts of violets are occasionally eaten by such birds as the Ruffed Grouse, Wild Turkey, and Mourning Dove, and they are also consumed by the White-Footed Mouse, Pine Mouse, and Eastern Chipmunk. Similarly, the foliage of these low-growing plants is a source of food for the Cottontail Rabbit and Wood Turtle (Clemmys insculpta) [1-6].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** 5"Plants For A Future" (en anglais) https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Viola+cucullata ***;***

    dont classification :

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;