Zanthoxylum americanum Mill., 1768 (Clavalier américain ou d'amérique,)

Identifiants : 41259/zaname

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 02/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
  - ***Clade : Rosidées ;***
  - ***Clade : Malvidées ;***
  - ***Ordre : Sapindales ;***
  - ***Famille : Rutaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Magnoliopsida ;***
  - ***Ordre : Sapindales ;***
  - ***Famille : Rutaceae ;***
  - ***Genre : Zanthoxylum ;***
- ***Synonymes : Xanthoxyum americanum (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)), Zanthoxylum fraxineum Willd. 1796 ;***
- ***Synonymes français : common prickly ash = bois jaune commun ou clavalier commun (tp*), pricklyash, prickly-ash, toothache tree, clavalier américain ou d'Amérique, clavalier à feuiller de Frêne ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Common pricklyash ;***

- ***Note comestibilité : ****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Graine - cuite ; elle est utilisée comme condiment ; un substitut du poivre ; le fruit est assez petit{{{5(+)}}} mais il est produit en grappes denses qui rend la récolte facile{{{5(K)}}} ; chaque fruit contient une seule graine{{{5(+)}}}.(1*)

  Les graines sont cuites et utilisées comme substitut du poivre

  (1*)ATTENTION : les tannins peuvent réduire l'absorption de fer par l'intestin ; possible stimulation du système nerveux ; l'ingestion excessive peut interférer avec le traitement anticoagulant.(1*)ATTENTION : les tannins peuvent réduire l'absorption de fer par l'intestin ; possible stimulation du système nerveux ; l'ingestion excessive peut interférer avec le traitement anticoagulant{{{5(+)}}}.

- ***Note médicinale : *****
- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par Bigelow, J., American medical botany (1817-1820) Amer. Med. Bot. vol. 3 (1820) t. 59, via plantillustrations
Par Duhamel du Monceau, H.L., Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition [Nouveau Duhamel] (1800-1819) Traité arbr. arbust., ed. 2 vol. 7 (1819) t. 2, via plantillustrations

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tempérée. Il convient aux zones de rusticité 3-7[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : It is a temperate plant. It suits hardiness zones 3-7[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Canada, Amérique du Nord, Slovénie, USA[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Canada, North America, Slovenia, USA[{{{0(+x)].

- ***Nombre de graines au gramme : 35 ;***
- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Zanthoxylum_americanum ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-28100527 ***;***

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Jackes, D. A., 2007, Edible Forest Gardens