

Brachychiton australis (Schott & Endl.) Terracino

Identifiants : 4960/braaus

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 10/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;
- Genre : Brachychiton ;

- Synonymes : *Brachychiton platanoïdes* R. Br, *Brachychiton trichosiphon* (Benth.) J. W. Audas, ?*Clompanus australis* Kuntze, *Sterculia australis* (Schott & Endl.) Druce, *Sterculia australis* var. *acuminata* Domin, *Sterculia australis* var. *dietrichiae* Domin, *Sterculia trichosiphon* Benth. [Illegitimate], *Trichosiphon australe* Schott & Endl ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Broad leafed bottle tree, ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Noix^{0(+x)}.

Les jeunes racines des semis peuvent être consommées

Partie testée : noix^{0(+x)} (traduction automatique)

Original : Nuts^{0(+x)}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
9.8	0	0	20.4	0	0	7.5	8.9



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il est originaire du nord-est de l'Australie. Il pousse dans les broussailles et les forêts de vignes des régions sèches. Il convient aux climats chauds et secs. Dans le centre du Queensland, il passe du niveau de la mer à 800 m d'altitude. Il nécessite un sol bien drainé et une position ensoleillée. Il convient aux zones de rusticité 10-12. Dans Townsville Anderson BG^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It is native to NE Australia. It grows in scrub and vine forests in dry regions. It suits hot, dry climates. In central Queensland it grows from sea level to 800 m altitude. It requires a well drained soil and a sunny position. It suits hardiness zones 10-12. In Townsville Anderson BG^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Australie *, Afrique de l'Est, Inde, Pakistan, Zimbabwe^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Asia, Australia*, East Africa, India, Pakistan, Zimbabwe^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 30 espèces de *Brachychiton*. La plupart sont en Australie. Aussi mis dans la famille Sterculiaceae^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are about 30 *Brachychiton* species. Most are in Australia. Also put in the family Sterculiaceae^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bailey, F. M., 1913, *Comprehensive Catalogue of Queensland Plants*. Queensland Government. (As *Sterculia trichosiphon*) ; Barwick, M., 2004, *Tropical and Subtropical Trees. A Worldwide Encyclopedic Guide*. Thames and Hudson p 57 ; Bodkin, F., 1991, *Encyclopedia Botanica*. Cornstalk publishing, p 163 ; Boll. Reale Orto Bot. Giardino Palermo 1(2):54, 62. 1897 ; Cooper, W. and Cooper, W., 2004, *Fruits of the Australian Tropical Rainforest*. Nokomis Editions, Victoria, Australia. p 528 ; Cribb, A.B. & J.W., 1976, *Wild Food in Australia*, Fontana. p 138 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1982, *Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation*. Vol 2. Lothian. p 365 ; Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, *Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and shrubs*. Random House, Australia. p 139 ; Fl. austral. 1:229. 1863 (As *Sterculia trichosiphon*) ; Flora of Pakistan. www.eFloras.org ; Krishen P., 2006, *Trees of Delhi, A Field Guide*. DK Books. p 154 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, *Handbook of Economic Plants of Australia*, CSIRO. p 36 ; Leiper, G & Houser, J., *Mutooroo. Plant Use by Australian Aboriginal People*. Assembly press, Queensland. ; Lim, T. K., 2015, *Edible Medicinal and Non Medicinal Plants. Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs*. Springer p 17 ; Lord, E.E., & Willis, J.H., 1999, *Shrubs and Trees for Australian gardens*. Lothian. p 13 ; Menninger, E.A., 1977, *Edible Nuts of the World*. Horticultural Books. Florida p 43 (As *Sterculia trichosiphon*) ; Nicholson, N & H., 2000, *Australian Rainforest Plants*, V. Terania Rainforest Publishing. NSW.p 15 ; Recher, P, 2001, *Fruit Spirit Botanical Gardens Plant Index*. www.nrg.com.au/~recher/seedlist.html p 4 ; Townsend, K., 1994, *Across the Top. Gardening with Australian Plants in the tropics*. Society for Growing Australian Plants, Townsville Branch Inc. p 104 ; Townsend, K., 1999, *Field Guide to Plants of the Dry Tropics*. Society for Growing Australian Plants, Townsville Branch Inc. p 25 ; Wickens, G.E., 1995, *Edible Nuts*. FAO Non-wood forest products. FAO, Rome. p156 (As *Sterculia trichosiphon*) ; Williams, J.B., Harden, G.J., and McDonald, W.J.F., 1984, *Trees and shrubs in rainforests of New South Wales and Southern Queensland*. Univ. of New England, Armidale. p 62