

Buddleja officinalis Maxim.

Identifiants : 5405/budoff

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 15/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Lamiales ;
- Famille : Scrophulariaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Scrophulariales ;
- Famille : Scrophulariaceae ;
- Genre : Buddleja ;

- Synonymes : Buddleja officinalis var. macrantha Lingelsheim ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Mi meng hua, ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fleurs- aromatisantes^{{{0(+x)}}}

ATTENTION: De nombreuses Loganiacées sont très toxiques. Les fleurs sont récoltées et utilisées pour le riz mourant

Partie testée : fleurs - saveur^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Flowers - flavour^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kJ)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée chaude à subtropicale. Il pousse à la lisière des forêts et sur les berges entre 200-2800 m d'altitude en Chine. Il poussera dans la plupart des sols. Il résiste à la sécheresse et au gel. Il convient aux zones de rusticité 8-10. Au Sichuan et au Yunnan^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : It is a warm temperate to subtropical plant. It grows on the edge of forests and on riverbanks between 200-2800 m altitude in China. It will grow in most soils. It is resistant to drought and frost. It suits hardiness zones 8-10. In Sichuan and Yunnan^{{{0(+x)}}.}

- **Localisation :**

Asie, Australie, Chine *, Indochine, Myanmar, Asie du Sud-Est, Tibet, Vietnam^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Asia, Australia, China*, Indochina, Myanmar, SE Asia, Tibet, Vietnam^{{{0(+x)}}.}

- **Notes :**

C'est une source de colorant pour la médecine alimentaire et le parfum. Il existe environ 90 à 100 espèces de Buddleja. Ils sont dans les régions tropicales et subtropicales. Mettez également dans la famille Buddlejaceae^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : It is a source of dye for food medicine and perfume. There are about 90-100 Buddleja species. They are in the tropics and subtropics. Also put in the family Buddlejaceae^{{{0(+x)}}.}

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 175 ; Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 26:496; Melanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 10:675. 1880 (Diagn. pl. nov. asiat.) ; Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and shrubs. Random House, Australia. p 147 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 62 ; Hao, J., Q. Shou & C. Wang. 1994. Natural edible yellow pigment of Buddleja officinalis. Tianran Chanwu Yanji Yu Kaifa 6:21-32. [Chem.Abstr.121:297139.] ; Li Ping-tao, Leewenburg, A., Loganiaceae. Flora of China. p 339 ; Liu, Yi-tao, & Long, Chun-Lin, 2002, Studies on Edible Flowers Consumed by Ethnic Groups in Yunnan. Acta Botanica Yunnanica. 24(1):41-56 ; Xu, Z., Tao, G. & Tan, J., 1988, Tropical Wild Flowers and Plants in Xishuangbanna, Agricultural Publishing House. photo 105