

Capparis flexuosa (L.) L.

Identifiants : 6286/capflx

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 14/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Brassicales ;
- Famille : Capparaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Capparales ;
- Famille : Capparaceae ;
- Genre : Capparis ;

- Synonymes : *Capparis cynophallophora* L. 1959 non sp. pl. 1753, *Capparis declinata* Vell, *Capparis didymobotrys* Ruiz & Pav. ex E. A. Lopez, *Capparis eucalyptifolia* Haught, *Capparis eustachiana* Jacq, *Capparis flexuosa* (L.) L. var. *cordifolia* Kitan, *Capparis flexuosa* f. *hastata* (Jacq.) Durand, *Capparis flexuosa* var. *saligna* (Vahl) Fawc. & Rendle, *Capparis guayaquilensis* Kunth, *Capparis guayaquilensis* subsp. *mollis* (Kunth) H.H. Iltis, *Capparis laetevirens* Mart, *Capparis laevigata* Mart, *Capparis laceolata* Ruiz & Pav. ex DC, *Capparis mollis* Kunth, *Capparis pluvialis* Mart, *Capparis saligna* Vahl, *Capparis sinclairii* Benth, *Capparis subbiloba* Kunth, *Capparis velloziana* Mart, *Colicodendron subbilobum* (Kunth) Seem, *Cyanophylla declinata* (Vell.) H. H. Iltis & X. Cornejo, *Cyanophylla flexuosa* (L.) J. Presl, *Cyanophylla guayaquilensis* (Kunth) H. H. Iltis, *Cyanophylla mollis* (Kunth) J. Presl, *Morisonia flexuosa* L., *Uterveria eustachiana* (Jacq.) Bertol ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Bay-leaved caper, , Black witty, Bottle wiss, Burro, Goat wiss, Hurihuri, Limber caper, Palawang, Palinguam, Palo de burro ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : fruits, boutons floraux - arôme^{{{0(+x)}} (traduction automatique)} | Original : Fruit, Flower buds - flavouring^{{{0(+x)}}}
Les boutons floraux sont utilisés comme des câpres



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 81 (As Capparis saligna) ; Ekman Herbarium records Haiti (As Capparis fluviatilis) ; Grandtner, M. M., 2008, World Dictionary of Trees. Wood and Forest Science Department. Laval University, Quebec, Qc Canada. (Internet database <http://www.WDT.QC.ca>) ; Grandtner, M. M. & Chevrette, J., 2013, Dictionary of Trees, Volume 2: South America: Nomenclature, Taxonomy and Ecology. Academic Press p 97 ; Plants of Haiti Smithsonian Institute <http://botany.si.edu> ; Scarpa, G. F., 2009, Wild food plants used by the indigenous peoples of South American Gran Chaco: A general synopsis and intercultural comparison. Journal of Applied Botany and Food Quality 83:90-101 ; www.theplantlist.org