Cardamine parviflora L., 1753
(Cardamine à petites fleurs)

Identifiants : 6599/carpar

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 10/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Malvidées ;***
    - ***Ordre : Brassicales ;***
    - ***Famille : Brassicaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Capparales ;***
    - ***Famille : Brassicaceae ;***
    - ***Genre : Cardamine ;***
- ***Synonymes : Cardamine brachycarpa Franchet (1879), not Opiz (1826), Cardamine fallax (O. E. Schulz) Nakai, Cardamine flexuosa subsp. fallax O. E. Schulz, Cardamine flexuosa subsp. fallax f. microphylla O. E. Schulz, Cardamine flexuosa var. fallax (O. E. Schulz) T. Y. Cheo & R. C. Fang, Cardamine koshiensis Koidzumi, Cardamine manshurica (Komarov) Nakai, Cardamine parviflora f. hispida Franchet, Cardamine parviflora var. manshurica Komarov, Cardamine scutata Thunberg subsp. fallax (O. E. Schulz) H. Hara ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : smallflowered bittercress , billeri a fiori piccoli (it) ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Feuilles$^{0(+x)}$. Les jeunes feuilles sont utilisées comme potherbe$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Les jeunes feuilles sont utilisées comme potiron

  Partie testée : feuilles$^{\{\{\{0(+x)}$ (traduction automatique)
  Original : Leaves$^{\{\{\{0(+x)}$

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0

  néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

Svensk botanik [J.W. Palmstruch et al] (vol. 8: t. 568 ; 1807), via plantillustrations.org

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tempérée. Il pousse sur les berges des rivières, le long des fossés, des prairies, au bord des routes; près du niveau de la mer à 2500 m d'altitude en Chine[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : It is a temperate plant. It grows on river banks, along ditches, meadows, roadsides; near sea level to 2500 m altitude in China[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Afrique, Algérie, Asie centrale, Chine, Europe, Japon, Kazakhstan, Corée, Mongolie, Afrique du Nord, Amérique du Nord, Russie, Asie du Sud-Ouest, USA[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Africa, Algeria, Central Asia, China, Europe, Japan, Kazakhstan, Korea, Mongolia, North Africa, North America, Russia, SW Asia, USA[{{{0(+x)].

  - ***Notes :***

    Il existe environ 160 espèces de Cardamine. Ils se trouvent principalement dans des endroits humides des régions tempérées[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : There are about 160 Cardamine species. They are mostly in damp places in temperate regions[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***Tela Botanica :*** https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-12921-synthese ***;***
  - ***INPN :*** https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957 ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2700230 ***;***

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Duke, J.A., 1992, Handbook of Edible Weeds. CRC Press. p 58 ; Seidemann J., 2005, World Spice Plants. Economic Usage, Botany, Taxonomy. Springer. p 84 ; Zhou Taiyan, Lu Lianli, Yang Guang; Ihsan A. Al-Shehbaz, BRASSICACEAE (CRUCIFERAE), Flora of China.