Celtis lindheimeri Engelm., 1873
(Palo blanco)

Identifiants : 7199/cellin

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 10/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Fabidées ;***
    - ***Ordre : Rosales ;***
    - ***Famille : Cannabaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Urticales ;***
    - ***Famille : Cannabaceae ;***
    - ***Genre : Celtis ;***
- ***Synonymes : Celtis helleri Small 1897, dont homonymes : Celtis lindheimeri Engelm. ex K.Koch 1873 ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Lindheimer's Hackberry , Palo blanco ;***

- ***Note comestibilité : *****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruit$^{0(+x)}$ (baies$^{(dp*)}$) comestible$^{0(+x)}$.

  Partie testée : fruit$^{{{{0(+x)}}}}$ (traduction automatique)
  Original : Fruit$^{{{{0(+x)}}}}$

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    Il pousse le long des ruisseaux dans les collines calcaires. Il pousse entre 300 et 600 m d'altitude au Mexique{{{0(+x) (traduction automatique)}.

    Original : It grows along streams in limestone hills. It grows between 300-600 m altitude in Mexico{{{0(+x)}.

  - ***Localisation :***

    Amérique centrale, Mexique, Amérique du Nord, USA{{{0(+x) (traduction automatique)}.

    Original : Central America, Mexico, North America, USA{{{0(+x)}.

  - ***Notes :***

    Il existe 70 à 100 espèces de Celtis. Ils sont principalement sous les tropiques. Il existe 8 à 10 espèces en Amérique tropicale. Également mis dans la famille des Ulmacées{{{0(+x) (traduction automatique)}.

    Original : There are 70-100 Celtis species. They are mostly in the tropics. There are 8-10 species in tropical America. Also put in the family Ulmaceae{{{0(+x)}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2708344 ***;***

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Little, E.L., 1980, National Audubon Society Field Guide to North American Trees. Alfred A. Knopf. p 413 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/