

Aechmea longifolia (Rudge) L. B. Sm. & M. A. Spencer

Identifiants : 750/aeclon

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 03/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Poales ;
- Famille : Bromeliaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Bromeliales ;
- Famille : Bromeliaceae ;
- Genre : Aechmea ;

- **Synonymes :** *Bromelia longifolia* Rudge, *Streptocalyx angustifolius* Mez, *Streptocalyx longifolius* (Rudge) Baker, ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Ananas bravo, , Gan ata ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Parties comestibles : fruits - boisson^{{{0(+x)}}} (traduction automatique) | Original : Fruit - drink^{{{0(+x)}}} La pulpe de fruit est utilisée pour les boissons



néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Fouquet, A. 1972. Espèces fruitières d'Amérique tropicale. Institut français de recherches fruitières outre-mer (Ifac) ; Kermath, B. M., et al, 2014, Food Plants in the Americas: A survey of the domesticated, cultivated and wild plants used for Human food in North, Central and South America and the Caribbean. On line draft. p 24 ; Smith, L. B. & M. A. Spencer. 1992. Reduction of Streptocalyx (Bromeliaceae: Bromelioideae). Phytologia 72(2):96-98.